

StrataClone PCR Cloning Kit - 5 reactions, Part Number 5500-0122

第一部分 物质或化合物和供应商的标识

GHS化学品标识	: StrataClone PCR Cloning Kit - 5 reactions, Part Number 5500-0122
产品号 (Chemical Kit)	: 5190-7280
产品号	: StrataClone Vector Mix amp/kan 5190-7280 StrataClone Cloning Buffer 240205-54 StrataClone Control Insert 240205-53 StrataClone SoloPack competent cells 200185-41 pUC 18 DNA Control Plasmid 200231-42
化学品的推荐用途和限制用途	
物质用途	: 分析试剂。 StrataClone Vector Mix amp/kan 0.001 mL (1 µl) StrataClone Cloning Buffer 0.063 mL StrataClone Control Insert 0.01 mL (50 ng 5 ng/µl) StrataClone SoloPack competent cells 1.05 mL (21 x 0.05 mL) pUC 18 DNA Control Plasmid 0.01 mL (0.1 ng/µl)
供应商/ 制造商	: Agilent Technologies Shanghai Co., Ltd. CALC-AP 412 Ying Lun Road Waigaoqiao Free Trade Zone Shanghai 200131 P. R. China
应急咨询电话 (带值班时间)	: CHEMTREC®: 4001-204937

第2部分 危险性概述

物质或混合物的分类根据 GB13690-2009 和 GB30000-2013

紧急情况概述

物理状态	: StrataClone Vector Mix amp/kan 液体。 StrataClone Cloning Buffer 液体。 StrataClone Control Insert 液体。 StrataClone SoloPack competent cells 液体。 pUC 18 DNA Control Plasmid 液体。
颜色	: StrataClone Vector Mix amp/kan 无资料。 StrataClone Cloning Buffer 无资料。 StrataClone Control Insert 无资料。 StrataClone SoloPack competent cells 无资料。 pUC 18 DNA Control Plasmid 无资料。
气味	: StrataClone Vector Mix amp/kan 无资料。 StrataClone Cloning Buffer 无资料。 StrataClone Control Insert 无资料。 StrataClone SoloPack competent cells 无资料。 pUC 18 DNA Control Plasmid 无资料。 StrataClone Vector Mix amp/kan H316 - 造成轻微皮肤刺激。 H320 - 造成眼刺激。 StrataClone Cloning Buffer H319 - 造成严重眼刺激。 H316 - 造成轻微皮肤刺激。 StrataClone Control Insert 没有明显的已知作用或严重危险。 StrataClone SoloPack competent cells H319 - 造成严重眼刺激。 pUC 18 DNA Control Plasmid H316 - 造成轻微皮肤刺激。 没有明显的已知作用或严重危险。

第2部分 危险性概述

StrataClone Vector Mix amp/kan	如发生皮肤刺激:	求医/就诊。	如仍觉眼刺激:	求医/就诊。
StrataClone Cloning Buffer	如发生皮肤刺激:	求医/就诊。	如仍觉眼刺激:	求医/就诊。
StrataClone Control Insert	不适用。			
StrataClone SoloPack competent cells	如发生皮肤刺激:	求医/就诊。	如仍觉眼刺激:	求医/就诊。
pUC 18 DNA Control Plasmid	不适用。			

有关环境保护措施, 请参阅第 12 节。

危险性类别

StrataClone Vector Mix amp/kan

H316	皮肤腐蚀/刺激 - 类别 3
H320	严重眼损伤/眼刺激 - 类别 2B

StrataClone Cloning Buffer

H316	皮肤腐蚀/刺激 - 类别 3
H319	严重眼损伤/眼刺激 - 类别 2A

StrataClone SoloPack competent cells

H316	皮肤腐蚀/刺激 - 类别 3
H319	严重眼损伤/眼刺激 - 类别 2A

StrataClone Vector Mix amp/kan	不适用。
StrataClone Cloning Buffer	不适用。
StrataClone Control Insert	不适用。
StrataClone SoloPack competent cells	混合物中由毒性未知的组分组成的比率: 1.1%
pUC 18 DNA Control Plasmid	不适用。

GHS标签要素

象形图



信号词

StrataClone Vector Mix amp/kan	警告
StrataClone Cloning Buffer	警告
StrataClone Control Insert	无信号词。
StrataClone SoloPack competent cells	警告
pUC 18 DNA Control Plasmid	无信号词。

危险性说明

StrataClone Vector Mix amp/kan	H316 - 造成轻微皮肤刺激。
StrataClone Cloning Buffer	H320 - 造成眼刺激。
StrataClone Control Insert	H319 - 造成严重眼刺激。
StrataClone SoloPack competent cells	H316 - 造成轻微皮肤刺激。
pUC 18 DNA Control Plasmid	没有明显的已知作用或严重危险。

防范说明

预防措施

StrataClone Vector Mix amp/kan	P264 - 操作后彻底清洗手部。
StrataClone Cloning Buffer	P280 - 戴防护眼镜、防护面罩。
StrataClone Control Insert	P264 - 操作后彻底清洗手部。
StrataClone SoloPack competent cells	不适用。
pUC 18 DNA Control Plasmid	P280 - 戴防护眼镜、防护面罩。

第2部分 危险性概述

事故响应	: StrataClone Vector Mix amp/kan	P332 + P313 - 如发生皮肤刺激: 求医/就诊。
	StrataClone Cloning Buffer	P305 + P351 + P338 - 如进入眼睛: 用水小心冲洗几分钟。 如戴隐形眼镜并可方便地取出, 取出隐形眼镜。 继续冲洗。 P337 + P313 - 如仍觉眼刺激: 求医/就诊。 P332 + P313 - 如发生皮肤刺激: 求医/就诊。 P305 + P351 + P338 - 如进入眼睛: 用水小心冲洗几分钟。 如戴隐形眼镜并可方便地取出, 取出隐形眼镜。 继续冲洗。
	StrataClone Control Insert	P337 + P313 - 如仍觉眼刺激: 求医/就诊。 不适用。
	StrataClone SoloPack	P332 + P313 - 如发生皮肤刺激: 求医/就诊。
	competent cells	P305 + P351 + P338 - 如进入眼睛: 用水小心冲洗几分钟。 如戴隐形眼镜并可方便地取出, 取出隐形眼镜。 继续冲洗。 P337 + P313 - 如仍觉眼刺激: 求医/就诊。 不适用。
安全储存	: pUC 18 DNA Control Plasmid	不适用。
	: StrataClone Vector Mix amp/kan	不适用。
	StrataClone Cloning Buffer	不适用。
	StrataClone Control Insert	不适用。
	StrataClone SoloPack	不适用。
	competent cells	不适用。
	pUC 18 DNA Control Plasmid	不适用。
废弃处置	: StrataClone Vector Mix amp/kan	不适用。
	StrataClone Cloning Buffer	不适用。
	StrataClone Control Insert	不适用。
	StrataClone SoloPack	不适用。
	competent cells	不适用。
	pUC 18 DNA Control Plasmid	不适用。
物理和化学危险	: StrataClone Vector Mix amp/kan	没有明显的已知作用或严重危险。
	StrataClone Cloning Buffer	没有明显的已知作用或严重危险。
	StrataClone Control Insert	没有明显的已知作用或严重危险。
	StrataClone SoloPack	没有明显的已知作用或严重危险。
	competent cells	没有明显的已知作用或严重危险。
	pUC 18 DNA Control Plasmid	没有明显的已知作用或严重危险。
健康危害	: StrataClone Vector Mix amp/kan	造成轻微皮肤刺激。 造成眼刺激。
	StrataClone Cloning Buffer	造成严重眼刺激。 造成轻微皮肤刺激。
	StrataClone Control Insert	没有明显的已知作用或严重危险。
	StrataClone SoloPack	造成严重眼刺激。 造成轻微皮肤刺激。
	competent cells	没有明显的已知作用或严重危险。
	pUC 18 DNA Control Plasmid	没有明显的已知作用或严重危险。
与物理、化学和毒理特性有关的症状		
眼睛接触	: StrataClone Vector Mix amp/kan	不利症状可能包括如下情况: 疼痛或刺激 流泪 充血发红
	StrataClone Cloning Buffer	不利症状可能包括如下情况: 疼痛或刺激 流泪

第2部分 危险性概述

	StrataClone Control Insert StrataClone SoloPack competent cells	充血发红 没有具体数据。 不利症状可能包括如下情况：
		疼痛或刺激 流泪 充血发红
吸入	pUC 18 DNA Control Plasmid : StrataClone Vector Mix amp/ kan StrataClone Cloning Buffer StrataClone Control Insert StrataClone SoloPack competent cells	没有具体数据。 没有具体数据。 没有具体数据。 没有具体数据。 没有具体数据。
皮肤接触	pUC 18 DNA Control Plasmid : StrataClone Vector Mix amp/ kan StrataClone Cloning Buffer	没有具体数据。 不利症状可能包括如下情况： 刺激 充血发红 不利症状可能包括如下情况：
	StrataClone Control Insert StrataClone SoloPack competent cells	刺激 充血发红 没有具体数据。 不利症状可能包括如下情况：
食入	pUC 18 DNA Control Plasmid : StrataClone Vector Mix amp/ kan StrataClone Cloning Buffer StrataClone Control Insert StrataClone SoloPack competent cells pUC 18 DNA Control Plasmid	刺激 充血发红 没有具体数据。 没有具体数据。 没有具体数据。 没有具体数据。 没有具体数据。
延迟和即时影响，以及短期和长期接触引起的慢性影响		
短期暴露		
潜在的即时效应	: 无资料。	
潜在的延迟效应	: 无资料。	
长期暴露		
潜在的即时效应	: 无资料。	
潜在的延迟效应	: 无资料。	
环境危害	: StrataClone Vector Mix amp/ kan StrataClone Cloning Buffer StrataClone Control Insert StrataClone SoloPack competent cells pUC 18 DNA Control Plasmid	没有明显的已知作用或严重危险。 没有明显的已知作用或严重危险。 没有明显的已知作用或严重危险。 没有明显的已知作用或严重危险。
其他危害	: StrataClone Vector Mix amp/ kan StrataClone Cloning Buffer StrataClone Control Insert StrataClone SoloPack competent cells pUC 18 DNA Control Plasmid	没有已知信息。 没有已知信息。 没有已知信息。 没有已知信息。 没有已知信息。

第3部分 成分 / 组成信息

物质 / 混合物	: StrataClone Vector Mix amp/kan	混合物
	StrataClone Cloning Buffer	混合物
	StrataClone Control Insert	混合物
	StrataClone SoloPack competent cells	混合物
	pUC 18 DNA Control Plasmid	混合物

美国化学文摘社(CAS)编号/其它标识号

组分名称	%	CAS号码
StrataClone Vector Mix amp/kan 甘油	≥50 - ≤75	56-81-5
StrataClone Cloning Buffer 聚乙二醇 氯化钠	≥10 - ≤25 ≤3	25322-68-3 7647-14-5
StrataClone SoloPack competent cells 甘油 二水合氯化钙	≥10 - ≤25 ≤3	56-81-5 10035-04-8

没有出现就供应商当前所知可应用的浓度，被分类为对健康或环境有害及因此需要在本节报告的添加剂。

职业暴露限制，如果有的话，列在第 8 节中。

第4部分 急救措施

急救措施的描述

吸入	: StrataClone Vector Mix amp/kan	将患者转移到空气新鲜处，休息，保持利于呼吸的体位。如没有呼吸，呼吸不规则或呼吸停止，由受过训练的人员进行人工呼吸或给氧。如使用嘴对嘴呼吸方法进行救助，可能会对救助者造成危险。如有害的健康影响持续存在或加重，应寻求医疗救治。如失去知觉，应置于康复位置并立即寻求医疗救治。保持呼吸道畅通。解开过紧的衣服，如领口、领带、皮带或腰带。
	StrataClone Cloning Buffer	将患者转移到空气新鲜处，休息，保持利于呼吸的体位。如没有呼吸，呼吸不规则或呼吸停止，由受过训练的人员进行人工呼吸或给氧。如使用嘴对嘴呼吸方法进行救助，可能会对救助者造成危险。如有害的健康影响持续存在或加重，应寻求医疗救治。如失去知觉，应置于康复位置并立即寻求医疗救治。保持呼吸道畅通。解开过紧的衣服，如领口、领带、皮带或腰带。
	StrataClone Control Insert	将患者转移到空气新鲜处，休息，保持利于呼吸的体位。如果出现症状，寻求医疗救护。
	StrataClone SoloPack competent cells	将患者转移到空气新鲜处，休息，保持利于呼吸的体位。如没有呼吸，呼吸不规则或呼吸停止，由受过训练的人员进行人工呼吸或给氧。如使用嘴对嘴呼吸方法进行救助，可能会对救助者造成危险。如有害的健康影响持续存在或加重，应寻求医疗救治。如失去知觉，应置于康复位置并立即寻求医疗救治。保持呼吸道畅通。解开过紧的衣服，如领口、

第4部分 急救措施

	pUC 18 DNA Control Plasmid	<p>领带、皮带或腰带。 将患者转移到空气新鲜处，休息，保持利于呼吸的体位。如果出现症状，寻求医疗救护。</p>
食入	: StrataClone Vector Mix amp/kan	<p>用水冲洗口腔。如有假牙请摘掉。 将患者转移到空气新鲜处，休息，保持利于呼吸的体位。 如物质已被吞下且患者保持清醒，可饮少量水。 如患者感到恶心就应停止，因为呕吐会有危险。 禁止催吐，除非有专业医疗人士指导。 如发生呕吐， 应保持头部朝下以避免呕吐物进入肺部。 如有害的健康影响持续存在或加重， 应寻求医疗救治。 切勿给失去意识者任何口服物。如失去知觉， 应置于康复位置并立即寻求医疗救治。 保持呼吸道畅通。解开过紧的衣服，如领口、 领带、皮带或腰带。</p>
	StrataClone Cloning Buffer	<p>用水冲洗口腔。如有假牙请摘掉。 将患者转移到空气新鲜处，休息，保持利于呼吸的体位。 如物质已被吞下且患者保持清醒，可饮少量水。 如患者感到恶心就应停止，因为呕吐会有危险。 禁止催吐，除非有专业医疗人士指导。 如发生呕吐， 应保持头部朝下以避免呕吐物进入肺部。 如有害的健康影响持续存在或加重， 应寻求医疗救治。</p>
	StrataClone Control Insert	<p>用水冲洗口腔。将患者转移到空气新鲜处，休息，保持利于呼吸的体位。 如物质已被吞下且患者保持清醒，可饮少量水。 禁止催吐，除非有专业医疗人士指导。 如果出现症状，寻求医疗救护。</p>
	StrataClone SoloPack competent cells	<p>用水冲洗口腔。如有假牙请摘掉。 将患者转移到空气新鲜处，休息，保持利于呼吸的体位。 如物质已被吞下且患者保持清醒，可饮少量水。 如患者感到恶心就应停止，因为呕吐会有危险。 禁止催吐，除非有专业医疗人士指导。 如发生呕吐， 应保持头部朝下以避免呕吐物进入肺部。 如有害的健康影响持续存在或加重， 应寻求医疗救治。 切勿给失去意识者任何口服物。如失去知觉， 应置于康复位置并立即寻求医疗救治。 保持呼吸道畅通。解开过紧的衣服，如领口、 领带、皮带或腰带。</p>
	pUC 18 DNA Control Plasmid	<p>用水冲洗口腔。将患者转移到空气新鲜处，休息，保持利于呼吸的体位。 如物质已被吞下且患者保持清醒，可饮少量水。 禁止催吐，除非有专业医疗人士指导。 如果出现症状，寻求医疗救护。</p>
皮肤接触	: StrataClone Vector Mix amp/kan	<p>用大量水冲洗受污染的皮肤。 脱去受污染的衣服和鞋子。 连续冲洗至少十分钟。 如有害的健康影响持续存在或加重， 应寻求医疗救治。衣物重新使用前应清洗。 鞋子在重新使用前应彻底清洗。</p>
	StrataClone Cloning Buffer	<p>用大量水冲洗受污染的皮肤。 脱去受污染的衣服和鞋子。</p>

第4部分 急救措施

连续冲洗至少十分钟。
如有害的健康影响持续存在或加重，应寻求医疗救治。衣物重新使用前应清洗。鞋子在重新使用前应彻底清洗。
用大量水冲洗受污染的皮肤。
脱去受污染的衣服和鞋子。如果出现症状，寻求医疗救护。
用大量水冲洗受污染的皮肤。
脱去受污染的衣服和鞋子。
连续冲洗至少十分钟。
如有害的健康影响持续存在或加重，应寻求医疗救治。衣物重新使用前应清洗。鞋子在重新使用前应彻底清洗。
用大量水冲洗受污染的皮肤。
脱去受污染的衣服和鞋子。如果出现症状，寻求医疗救护。

眼睛接触

: StrataClone Vector Mix amp/kan
StrataClone Cloning Buffer
StrataClone Control Insert
StrataClone SoloPack competent cells
pUC 18 DNA Control Plasmid

立即用大量水冲洗眼睛，并不时提起上下眼睑。检查和取出任何隐形眼镜。
连续冲洗至少十分钟。如刺激持续，就医。
立即用大量水冲洗眼睛，并不时提起上下眼睑。检查和取出任何隐形眼镜。
连续冲洗至少十分钟。寻求医疗救护。
立即用大量水冲洗眼睛，并不时提起上下眼睑。检查和取出任何隐形眼镜。如果感到疼痛，请就医治疗。
立即用大量水冲洗眼睛，并不时提起上下眼睑。检查和取出任何隐形眼镜。
连续冲洗至少十分钟。寻求医疗救护。
立即用大量水冲洗眼睛，并不时提起上下眼睑。检查和取出任何隐形眼镜。如果感到疼痛，请就医治疗。

最重要的症状和健康影响

潜在的急性健康影响

吸入

: StrataClone Vector Mix amp/kan
StrataClone Cloning Buffer
StrataClone Control Insert
StrataClone SoloPack competent cells
pUC 18 DNA Control Plasmid

没有明显的已知作用或严重危险。
没有明显的已知作用或严重危险。
没有明显的已知作用或严重危险。
没有明显的已知作用或严重危险。
没有明显的已知作用或严重危险。

食入

: StrataClone Vector Mix amp/kan
StrataClone Cloning Buffer
StrataClone Control Insert
StrataClone SoloPack competent cells
pUC 18 DNA Control Plasmid

没有明显的已知作用或严重危险。
没有明显的已知作用或严重危险。
没有明显的已知作用或严重危险。
没有明显的已知作用或严重危险。
没有明显的已知作用或严重危险。

皮肤接触

: StrataClone Vector Mix amp/kan
StrataClone Cloning Buffer
StrataClone Control Insert
StrataClone SoloPack competent cells
pUC 18 DNA Control Plasmid

造成轻微皮肤刺激。
造成轻微皮肤刺激。
没有明显的已知作用或严重危险。
造成轻微皮肤刺激。
没有明显的已知作用或严重危险。

眼睛接触

: StrataClone Vector Mix amp/kan
StrataClone Cloning Buffer
StrataClone Control Insert
StrataClone SoloPack competent cells
pUC 18 DNA Control Plasmid

造成眼刺激。
造成严重眼刺激。
没有明显的已知作用或严重危险。
造成严重眼刺激。
没有明显的已知作用或严重危险。

第4部分 急救措施

过度接触征兆/症状

吸入	: StrataClone Vector Mix amp/kan	没有具体数据。
	StrataClone Cloning Buffer	没有具体数据。
	StrataClone Control Insert	没有具体数据。
	StrataClone SoloPack competent cells	没有具体数据。
	pUC 18 DNA Control Plasmid	没有具体数据。
食入	: StrataClone Vector Mix amp/kan	没有具体数据。
	StrataClone Cloning Buffer	没有具体数据。
	StrataClone Control Insert	没有具体数据。
	StrataClone SoloPack competent cells	没有具体数据。
	pUC 18 DNA Control Plasmid	没有具体数据。
皮肤	: StrataClone Vector Mix amp/kan	不利症状可能包括如下情况: 刺激 充血发红
	StrataClone Cloning Buffer	不利症状可能包括如下情况: 刺激 充血发红
	StrataClone Control Insert	没有具体数据。
	StrataClone SoloPack competent cells	不利症状可能包括如下情况: 刺激 充血发红
	pUC 18 DNA Control Plasmid	没有具体数据。
眼睛	: StrataClone Vector Mix amp/kan	不利症状可能包括如下情况: 疼痛或刺激 流泪 充血发红
	StrataClone Cloning Buffer	不利症状可能包括如下情况: 疼痛或刺激 流泪 充血发红
	StrataClone Control Insert	没有具体数据。
	StrataClone SoloPack competent cells	不利症状可能包括如下情况: 疼痛或刺激 流泪 充血发红
	pUC 18 DNA Control Plasmid	没有具体数据。

必要时注明要立即就医及所需特殊治疗

特殊处理	: StrataClone Vector Mix amp/kan	无特殊处理。
	StrataClone Cloning Buffer	无特殊处理。
	StrataClone Control Insert	无特殊处理。
	StrataClone SoloPack competent cells	无特殊处理。
	pUC 18 DNA Control Plasmid	无特殊处理。

对医生的特别提示	: StrataClone Vector Mix amp/kan	对症处理 如果被大量摄入或吸入,立即联系中毒处置专家。
	StrataClone Cloning Buffer	对症处理 如果被大量摄入或吸入,立即联系中毒处置专家。
	StrataClone Control Insert	对症处理 如果被大量摄入或吸入,立即联系中毒处置专家。
	StrataClone SoloPack competent cells	对症处理 如果被大量摄入或吸入,立即联系中毒处置专家。
	pUC 18 DNA Control Plasmid	对症处理 如果被大量摄入或吸入,立即联系中毒处置专家。

第4部分 急救措施

<p>对保护施救者的忠告</p>	<p>StrataClone Vector Mix amp/kan</p> <p>StrataClone Cloning Buffer</p> <p>StrataClone Control Insert</p> <p>StrataClone SoloPack competent cells</p> <p>pUC 18 DNA Control Plasmid</p>	<p>如果有任何人身危险或尚未接受适当培训时，不可采取行动。</p> <p>如使用嘴对嘴呼吸方法进行救助，可能会对救助者造成危险。</p> <p>如果有任何人身危险或尚未接受适当培训时，不可采取行动。</p> <p>如使用嘴对嘴呼吸方法进行救助，可能会对救助者造成危险。</p> <p>如果有任何人身危险或尚未接受适当培训时，不可采取行动。</p> <p>如使用嘴对嘴呼吸方法进行救助，可能会对救助者造成危险。</p> <p>如果有任何人身危险或尚未接受适当培训时，不可采取行动。</p> <p>如使用嘴对嘴呼吸方法进行救助，可能会对救助者造成危险。</p> <p>如果有任何人身危险或尚未接受适当培训时，不可采取行动。</p>
-------------------------	---	--

请参阅“毒理学资料”（第 11 部分）

第5部分 消防措施

灭火介质

<p>合适的</p>	<p>StrataClone Vector Mix amp/kan</p> <p>StrataClone Cloning Buffer</p> <p>StrataClone Control Insert</p> <p>StrataClone SoloPack competent cells</p> <p>pUC 18 DNA Control Plasmid</p>	<p>使用适合扑灭周围火灾的灭火剂。</p> <p>使用适合扑灭周围火灾的灭火剂。</p> <p>使用适合扑灭周围火灾的灭火剂。</p> <p>使用适合扑灭周围火灾的灭火剂。</p> <p>使用适合扑灭周围火灾的灭火剂。</p>
<p>不适用的</p>	<p>StrataClone Vector Mix amp/kan</p> <p>StrataClone Cloning Buffer</p> <p>StrataClone Control Insert</p> <p>StrataClone SoloPack competent cells</p> <p>pUC 18 DNA Control Plasmid</p>	<p>没有已知信息。</p> <p>没有已知信息。</p> <p>没有已知信息。</p> <p>没有已知信息。</p> <p>没有已知信息。</p>

特别危险性

<p>StrataClone Vector Mix amp/kan</p> <p>StrataClone Cloning Buffer</p> <p>StrataClone Control Insert</p> <p>StrataClone SoloPack competent cells</p> <p>pUC 18 DNA Control Plasmid</p>	<p>在燃烧或加热情况下，会发生压力增加与容器爆裂。</p> <p>在燃烧或加热情况下，会发生压力增加与容器爆裂。</p> <p>在燃烧或加热情况下，会发生压力增加与容器爆裂。</p> <p>在燃烧或加热情况下，会发生压力增加与容器爆裂。</p> <p>在燃烧或加热情况下，会发生压力增加与容器爆裂。</p> <p>在燃烧或加热情况下，会发生压力增加与容器爆裂。</p>
---	---

有害的热分解产物

<p>StrataClone Vector Mix amp/kan</p> <p>StrataClone Cloning Buffer</p> <p>StrataClone Control Insert</p> <p>StrataClone SoloPack competent cells</p> <p>pUC 18 DNA Control Plasmid</p>	<p>分解产物可能包括如下物质：</p> <p>二氧化碳</p> <p>一氧化碳</p> <p>分解产物可能包括如下物质：</p> <p>二氧化碳</p> <p>一氧化碳</p> <p>卤化物</p> <p>金属氧化物</p> <p>没有具体数据。</p> <p>分解产物可能包括如下物质：</p> <p>二氧化碳</p> <p>一氧化碳</p> <p>卤化物</p> <p>金属氧化物</p> <p>没有具体数据。</p>
---	--

第5部分 消防措施

消防员的特殊防护	: StrataClone Vector Mix amp/kan StrataClone Cloning Buffer StrataClone Control Insert StrataClone SoloPack competent cells pUC 18 DNA Control Plasmid	如有火灾，撤离所有人员离开灾区及邻近处，以迅速隔离现场。 如果有任何人身危险或尚未接受适当培训时，不可采取行动。 如有火灾，撤离所有人员离开灾区及邻近处，以迅速隔离现场。 如果有任何人身危险或尚未接受适当培训时，不可采取行动。 如有火灾，撤离所有人员离开灾区及邻近处，以迅速隔离现场。 如果有任何人身危险或尚未接受适当培训时，不可采取行动。 如有火灾，撤离所有人员离开灾区及邻近处，以迅速隔离现场。 如果有任何人身危险或尚未接受适当培训时，不可采取行动。 如有火灾，撤离所有人员离开灾区及邻近处，以迅速隔离现场。 如果有任何人身危险或尚未接受适当培训时，不可采取行动。
消防人员特殊防护设备	: StrataClone Vector Mix amp/kan StrataClone Cloning Buffer StrataClone Control Insert StrataClone SoloPack competent cells pUC 18 DNA Control Plasmid	消防人员须穿戴适当的防护设备和带有保护整个面部的正压自给式呼吸装置 (SCBA)。 消防人员须穿戴适当的防护设备和带有保护整个面部的正压自给式呼吸装置 (SCBA)。 消防人员须穿戴适当的防护设备和带有保护整个面部的正压自给式呼吸装置 (SCBA)。 消防人员须穿戴适当的防护设备和带有保护整个面部的正压自给式呼吸装置 (SCBA)。 消防人员须穿戴适当的防护设备和带有保护整个面部的正压自给式呼吸装置 (SCBA)。 消防人员须穿戴适当的防护设备和带有保护整个面部的正压自给式呼吸装置 (SCBA)。

第6部分 泄漏应急处理

人员防护措施、防护装备和应急处置程序

非应急人	: StrataClone Vector Mix amp/kan StrataClone Cloning Buffer StrataClone Control Insert StrataClone SoloPack competent cells pUC 18 DNA Control Plasmid	如果有任何人身危险或尚未接受适当培训时，不可采取行动。 疏散周围区域。 防止无关人员和无防护的人员进入。 禁止接触或走过溢出物质。 避免吸入蒸气或烟雾。 提供足够的通风。 通风不充足时应戴合适的呼吸器。 穿戴合适的个人防护装备。 如果有任何人身危险或尚未接受适当培训时，不可采取行动。 疏散周围区域。 防止无关人员和无防护的人员进入。 禁止接触或走过溢出物质。 避免吸入蒸气或烟雾。 提供足够的通风。 通风不充足时应戴合适的呼吸器。 穿戴合适的个人防护装备。 如果有任何人身危险或尚未接受适当培训时，不可采取行动。 疏散周围区域。 防止无关人员和无防护的人员进入。 禁止接触或走过溢出物质。 避免吸入蒸气或烟雾。 提供足够的通风。 通风不充足时应戴合适的呼吸器。 穿戴合适的个人防护装备。 如果有任何人身危险或尚未接受适当培训时，不可采取行动。 疏散周围区域。 防止无关人员和无防护的人员进入。
-------------	--	--

第6部分 泄漏应急处理

应急人	<p>StrataClone Vector Mix amp/kan</p> <p>StrataClone Cloning Buffer</p> <p>StrataClone Control Insert</p> <p>StrataClone SoloPack competent cells</p> <p>pUC 18 DNA Control Plasmid</p>	<p>禁止接触或走过溢出物质。 穿戴合适的个人防护装备。</p> <p>如需穿戴特殊的服装来处理泄漏物，请参考第8部分关于合适的和不合适的物料的信息。参见“非紧急反应人员”部分的信息。</p> <p>如需穿戴特殊的服装来处理泄漏物，请参考第8部分关于合适的和不合适的物料的信息。参见“非紧急反应人员”部分的信息。</p> <p>如需穿戴特殊的服装来处理泄漏物，请参考第8部分关于合适的和不合适的物料的信息。参见“非紧急反应人员”部分的信息。</p> <p>如需穿戴特殊的服装来处理泄漏物，请参考第8部分关于合适的和不合适的物料的信息。参见“非紧急反应人员”部分的信息。</p> <p>如需穿戴特殊的服装来处理泄漏物，请参考第8部分关于合适的和不合适的物料的信息。参见“非紧急反应人员”部分的信息。</p>
环境保护措施	<p>StrataClone Vector Mix amp/kan</p> <p>StrataClone Cloning Buffer</p> <p>StrataClone Control Insert</p> <p>StrataClone SoloPack competent cells</p> <p>pUC 18 DNA Control Plasmid</p>	<p>避免溢出物扩散和流走， 避免溢出物接触进入土壤、河流、 下水道和污水管道。如产品已经导致环境污染（下水道，水道，土壤或空气）， 请通知有关当局。</p> <p>避免溢出物扩散和流走， 避免溢出物接触进入土壤、河流、 下水道和污水管道。如产品已经导致环境污染（下水道，水道，土壤或空气）， 请通知有关当局。</p> <p>避免溢出物扩散和流走， 避免溢出物接触进入土壤、河流、 下水道和污水管道。如产品已经导致环境污染（下水道，水道，土壤或空气）， 请通知有关当局。</p> <p>避免溢出物扩散和流走， 避免溢出物接触进入土壤、河流、 下水道和污水管道。如产品已经导致环境污染（下水道，水道，土壤或空气）， 请通知有关当局。</p> <p>避免溢出物扩散和流走， 避免溢出物接触进入土壤、河流、 下水道和污水管道。如产品已经导致环境污染（下水道，水道，土壤或空气）， 请通知有关当局。</p>
泄漏化学品的收容、 清除方法及所使用的处置材料	<p>StrataClone Vector Mix amp/kan</p> <p>StrataClone Cloning Buffer</p> <p>StrataClone Control Insert</p> <p>StrataClone SoloPack competent cells</p>	<p>若无危险，阻止泄漏。将容器移离泄漏区域。 如果溶于水，用水稀释并抹除。相应的， 如果不溶于水， 用一种惰性的干燥物料吸收并置于合适的废弃处置容器中。 经由特许的废弃物处理合同商处置。</p> <p>若无危险，阻止泄漏。将容器移离泄漏区域。 如果溶于水，用水稀释并抹除。相应的， 如果不溶于水， 用一种惰性的干燥物料吸收并置于合适的废弃处置容器中。 经由特许的废弃物处理合同商处置。</p> <p>若无危险，阻止泄漏。将容器移离泄漏区域。 如果溶于水，用水稀释并抹除。相应的， 如果不溶于水， 用一种惰性的干燥物料吸收并置于合适的废弃处置容器中。 经由特许的废弃物处理合同商处置。</p> <p>若无危险，阻止泄漏。将容器移离泄漏区域。 如果溶于水，用水稀释并抹除。相应的， 如果不溶于水， 用一种惰性的干燥物料吸收并置于合适的废弃处置容器中。 经由特许的废弃物处理合同商处置。</p>

第6部分 泄漏应急处理

pUC 18 DNA Control Plasmid

若无危险，阻止泄漏。将容器移离泄漏区域。如果溶于水，用水稀释并抹除。相应的，如果不溶于水，用一种惰性的干燥物料吸收并置于合适的废弃处置容器中。经由特许的废弃物处理合同商处置。

第7部分 操作处置与储存

安全搬运的防范措施

防护措施

:  StrataClone Vector Mix amp/kan

穿戴适当的个人防护设备（参阅第 8 部分）。禁止食入。避免接触眼睛、皮肤及衣物。避免吸入蒸气或烟雾。保持在原装容器或已批准的由相容的材料制成的代替品中，不使用时容器保持密闭。空容器中保留有产品残余物且可能非常危险。请勿重复使用容器。


StrataClone Cloning Buffer

穿戴适当的个人防护设备（参阅第 8 部分）。禁止食入。避免接触眼睛、皮肤及衣物。避免吸入蒸气或烟雾。保持在原装容器或已批准的由相容的材料制成的代替品中，不使用时容器保持密闭。空容器中保留有产品残余物且可能非常危险。请勿重复使用容器。

StrataClone Control Insert
StrataClone SoloPack
competent cells

穿戴适当的个人防护设备（参阅第 8 部分）。穿戴适当的个人防护设备（参阅第 8 部分）。禁止食入。避免接触眼睛、皮肤及衣物。避免吸入蒸气或烟雾。保持在原装容器或已批准的由相容的材料制成的代替品中，不使用时容器保持密闭。空容器中保留有产品残余物且可能非常危险。请勿重复使用容器。

一般职业卫生建议

:  StrataClone Vector Mix amp/kan

穿戴适当的个人防护设备（参阅第 8 部分）。应当禁止在本物质的处理、储存和加工区域饮食和抽烟。工作人员应在饮食和抽烟之前洗手。进入饮食区域前，脱去污染的衣物和防护装备。参见第8部分的卫生防护措施的其他信息。

StrataClone Cloning Buffer

应当禁止在本物质的处理、储存和加工区域饮食和抽烟。工作人员应在饮食和抽烟之前洗手。进入饮食区域前，脱去污染的衣物和防护装备。参见第8部分的卫生防护措施的其他信息。

StrataClone Control Insert

应当禁止在本物质的处理、储存和加工区域饮食和抽烟。工作人员应在饮食和抽烟之前洗手。进入饮食区域前，脱去污染的衣物和防护装备。参见第8部分的卫生防护措施的其他信息。

StrataClone SoloPack
competent cells

潜在的生物危害性材料。应当禁止在本物质的处理、储存和加工区域饮食和抽烟。工作人员应在饮食和抽烟之前洗手。进入饮食区域前，脱去污染的衣物和防护装备。参见第8部分的卫生防护措施的其他信息。

pUC 18 DNA Control Plasmid

应当禁止在本物质的处理、储存和加工区域饮食和抽烟。工作人员应在饮食和抽烟之前洗手。进入饮食区域前，脱去污染的衣物和防护装备。参见第8部分的卫生防护措施的其他信息。

第7部分 操作处置与储存

安全存储的条件，
包括任何不相容性

: StrataClone Vector Mix amp/
kan

按照当地法规要求来储存。 储存于原装容器中，防止直接光照，置于干燥、凉爽和通风良好的区域，远离禁忌物（见第10部分）、食品和饮料。 使用容器前，保持容器关紧与密封。

已开封的容器必须小心地再封好，并保持直立以防止漏出。

请勿储存在未加标签的容器中。

采用合适的收容方式以防止污染环境。

StrataClone Cloning Buffer

按照当地法规要求来储存。 储存于原装容器中，防止直接光照，置于干燥、凉爽和通风良好的区域，远离禁忌物（见第10部分）、食品和饮料。 使用容器前，保持容器关紧与密封。

已开封的容器必须小心地再封好，并保持直立以防止漏出。

请勿储存在未加标签的容器中。

采用合适的收容方式以防止污染环境。

StrataClone Control Insert

按照当地法规要求来储存。 储存于原装容器中，防止直接光照，置于干燥、凉爽和通风良好的区域，远离禁忌物（见第10部分）、食品和饮料。 使用容器前，保持容器关紧与密封。

已开封的容器必须小心地再封好，并保持直立以防止漏出。

请勿储存在未加标签的容器中。

采用合适的收容方式以防止污染环境。

StrataClone SoloPack
competent cells

按照当地法规要求来储存。 储存于原装容器中，防止直接光照，置于干燥、凉爽和通风良好的区域，远离禁忌物（见第10部分）、食品和饮料。 使用容器前，保持容器关紧与密封。

已开封的容器必须小心地再封好，并保持直立以防止漏出。

请勿储存在未加标签的容器中。

采用合适的收容方式以防止污染环境。

pUC 18 DNA Control Plasmid

按照当地法规要求来储存。 储存于原装容器中，防止直接光照，置于干燥、凉爽和通风良好的区域，远离禁忌物（见第10部分）、食品和饮料。 使用容器前，保持容器关紧与密封。

已开封的容器必须小心地再封好，并保持直立以防止漏出。

请勿储存在未加标签的容器中。

采用合适的收容方式以防止污染环境。

第8部分 接触控制和个体防护

控制参数

职业接触限值

☑ 已知的接触限值。

工程控制

: ☑ 好的全面通风应当足以控制工人工作环境的空气传播污染物含量。

环境接触控制

: 应检测由通风或工作过程装备的排放物以保证它们满足环境保护法规的要求。在某些情况下，为了将排放物减至能接受的含量，有必要改装烟雾洗涤器，过滤器或过程装备。

个人防护措施

卫生措施

: ☑ 视为生物危害（生物安全级别1）。 接触化学物质后，在饭前、吸烟前、入厕前和工作结束后要彻底清洗手、前臂和脸。

采用适当的技术移除可能已遭污染的衣物。 污染的衣物重新使用前需清洗。

确保洗眼台和安全淋浴室靠近工作处。

第8部分 接触控制和个体防护

- 呼吸系统防护** : 由于存在暴露的危险和可能性, 请选择符合适当标准或认证的呼吸器。呼吸器必须按照呼吸防护计划使用, 并确保正确的装配、训练以及其他重要方面的使用。
- 眼睛防护** : 若风险评估结果表明必须避免暴露在液体飞溅物、水雾、气体或粉尘下, 请配带符合标准的安全眼镜。如果可能发生接触, 应穿戴以下防护装备, 除非评估结果表明需要更高级别的防护: 防化学品飞溅护目镜。
- 身体防护**
- 手防护** : 若风险评估结果表明是必要的, 在接触化学产品时, 请始终配带符合标准的抗化学腐蚀, 不渗透的手套。考虑手套制造商指定的参数, 在使用过程中检查手套是否仍然保持其防护性能。应该指出, 任何手套材料的突破时间可能会针对不同的手套制造商而不同。一旦混合物含有几种物质时, 手套的防护时间无法准确估计。
- 身体防护** : 个人防护用品的选择应以执行工作种类和所冒风险为根据, 并且须得到专业人员的核准。
- 其他皮肤防护** : 合适的鞋类和任何其他皮肤防护措施的选择应基于正在执行的任务和所涉及的风险, 并在操作处置该产品之前得到专家的许可。

第9部分 理化特性

外观

物理状态	StrataClone Vector Mix amp/kan	液体。
	StrataClone Cloning Buffer	液体。
	StrataClone Control Insert	液体。
	StrataClone SoloPack competent cells	液体。
	pUC 18 DNA Control Plasmid	液体。
颜色	StrataClone Vector Mix amp/kan	无资料。
	StrataClone Cloning Buffer	无资料。
	StrataClone Control Insert	无资料。
	StrataClone SoloPack competent cells	无资料。
	pUC 18 DNA Control Plasmid	无资料。
气味	StrataClone Vector Mix amp/kan	无资料。
	StrataClone Cloning Buffer	无资料。
	StrataClone Control Insert	无资料。
	StrataClone SoloPack competent cells	无资料。
	pUC 18 DNA Control Plasmid	无资料。
气味阈值	StrataClone Vector Mix amp/kan	无资料。
	StrataClone Cloning Buffer	无资料。
	StrataClone Control Insert	无资料。
	StrataClone SoloPack competent cells	无资料。
	pUC 18 DNA Control Plasmid	无资料。
pH值	StrataClone Vector Mix amp/kan	无资料。
	StrataClone Cloning Buffer	无资料。
	StrataClone Control Insert	无资料。
	StrataClone SoloPack competent cells	无资料。
	pUC 18 DNA Control Plasmid	7.5
熔点	StrataClone Vector Mix amp/kan	无资料。
	StrataClone Cloning Buffer	无资料。
	StrataClone Control Insert	0°C (32°F (华氏度))
	StrataClone SoloPack competent cells	无资料。
	pUC 18 DNA Control Plasmid	0°C (32°F (华氏度))

第9部分 理化特性

沸点	: StrataClone Vector Mix amp/ kan StrataClone Cloning Buffer StrataClone Control Insert StrataClone SoloPack competent cells pUC 18 DNA Control Plasmid	无资料。 无资料。 100°C (212°F (华氏度)) 无资料。 100°C (212°F (华氏度))
闪点	: StrataClone Vector Mix amp/ kan StrataClone Cloning Buffer StrataClone Control Insert StrataClone SoloPack competent cells pUC 18 DNA Control Plasmid	无资料。 无资料。 无资料。 无资料。 无资料。 无资料。
蒸发速率	: StrataClone Vector Mix amp/ kan StrataClone Cloning Buffer StrataClone Control Insert StrataClone SoloPack competent cells pUC 18 DNA Control Plasmid	无资料。 无资料。 无资料。 无资料。 无资料。 无资料。
易燃性 (固体、气体)	: StrataClone Vector Mix amp/ kan StrataClone Cloning Buffer StrataClone Control Insert StrataClone SoloPack competent cells pUC 18 DNA Control Plasmid	不适用。 不适用。 不适用。 不适用。 不适用。 不适用。
爆炸 (燃烧) 上限和下限	: StrataClone Vector Mix amp/ kan StrataClone Cloning Buffer StrataClone Control Insert StrataClone SoloPack competent cells pUC 18 DNA Control Plasmid	无资料。 无资料。 无资料。 无资料。 无资料。 无资料。
蒸气压	: StrataClone Vector Mix amp/ kan StrataClone Cloning Buffer StrataClone Control Insert StrataClone SoloPack competent cells pUC 18 DNA Control Plasmid	无资料。 无资料。 无资料。 无资料。 无资料。 无资料。
蒸气密度	: StrataClone Vector Mix amp/ kan StrataClone Cloning Buffer StrataClone Control Insert StrataClone SoloPack competent cells pUC 18 DNA Control Plasmid	无资料。 无资料。 无资料。 无资料。 无资料。 无资料。
相对密度	: StrataClone Vector Mix amp/ kan StrataClone Cloning Buffer StrataClone Control Insert StrataClone SoloPack competent cells pUC 18 DNA Control Plasmid	无资料。 无资料。 无资料。 无资料。 无资料。 无资料。

第9部分 理化特性

溶解性	StrataClone Vector Mix amp/kan	易溶于下列物质：冷水和热水。
	StrataClone Cloning Buffer	在下列物质中可溶：冷水和热水。
	StrataClone Control Insert	易溶于下列物质：冷水和热水。
	StrataClone SoloPack competent cells	在下列物质中可溶：冷水和热水。
	pUC 18 DNA Control Plasmid	易溶于下列物质：冷水和热水。
辛醇 / 水分配系数	StrataClone Vector Mix amp/kan	无资料。
	StrataClone Cloning Buffer	无资料。
	StrataClone Control Insert	无资料。
	StrataClone SoloPack competent cells	无资料。
	pUC 18 DNA Control Plasmid	无资料。
自燃温度	StrataClone Vector Mix amp/kan	无资料。
	StrataClone Cloning Buffer	无资料。
	StrataClone Control Insert	无资料。
	StrataClone SoloPack competent cells	无资料。
	pUC 18 DNA Control Plasmid	无资料。
分解温度	StrataClone Vector Mix amp/kan	无资料。
	StrataClone Cloning Buffer	无资料。
	StrataClone Control Insert	无资料。
	StrataClone SoloPack competent cells	无资料。
	pUC 18 DNA Control Plasmid	无资料。
黏度	StrataClone Vector Mix amp/kan	无资料。
	StrataClone Cloning Buffer	无资料。
	StrataClone Control Insert	无资料。
	StrataClone SoloPack competent cells	无资料。
	pUC 18 DNA Control Plasmid	无资料。

第10部分 稳定性和反应性

活动性	StrataClone Vector Mix amp/kan	无本品或其成分反应性相关的试验数据。
	StrataClone Cloning Buffer	无本品或其成分反应性相关的试验数据。
	StrataClone Control Insert	无本品或其成分反应性相关的试验数据。
	StrataClone SoloPack competent cells	无本品或其成分反应性相关的试验数据。
	pUC 18 DNA Control Plasmid	无本品或其成分反应性相关的试验数据。
稳定性	StrataClone Vector Mix amp/kan	本产品稳定。
	StrataClone Cloning Buffer	本产品稳定。
	StrataClone Control Insert	本产品稳定。
	StrataClone SoloPack competent cells	本产品稳定。
	pUC 18 DNA Control Plasmid	本产品稳定。
危险反应	StrataClone Vector Mix amp/kan	在正常状态下储存与使用不会发生危险化学反应。
	StrataClone Cloning Buffer	在正常状态下储存与使用不会发生危险化学反应。
	StrataClone Control Insert	在正常状态下储存与使用不会发生危险化学反应。
	StrataClone SoloPack competent cells	在正常状态下储存与使用不会发生危险化学反应。
	pUC 18 DNA Control Plasmid	在正常状态下储存与使用不会发生危险化学反应。

第10部分 稳定性和反应性

应避免的条件	<ul style="list-style-type: none"> 1) StrataClone Vector Mix amp/kan 2) StrataClone Cloning Buffer 3) StrataClone Control Insert 4) StrataClone SoloPack competent cells 5) pUC 18 DNA Control Plasmid 	<ul style="list-style-type: none"> 1) 没有具体数据。 2) 没有具体数据。 3) 没有具体数据。 4) 没有具体数据。 5) 没有具体数据。
禁配物	<ul style="list-style-type: none"> 1) StrataClone Vector Mix amp/kan 2) StrataClone Cloning Buffer 3) StrataClone Control Insert 4) StrataClone SoloPack competent cells 5) pUC 18 DNA Control Plasmid 	<ul style="list-style-type: none"> 1) 会与氧化剂起反应或与氧化剂不相容。 2) 会与氧化剂起反应或与氧化剂不相容。 3) 会与氧化剂起反应或与氧化剂不相容。 4) 会与氧化剂起反应或与氧化剂不相容。 5) 会与氧化剂起反应或与氧化剂不相容。
危险的分解产物	<ul style="list-style-type: none"> 1) StrataClone Vector Mix amp/kan 2) StrataClone Cloning Buffer 3) StrataClone Control Insert 4) StrataClone SoloPack competent cells 5) pUC 18 DNA Control Plasmid 	<ul style="list-style-type: none"> 1) 在通常的储存和使用条件下,不会产生危险的分解产物。 2) 在通常的储存和使用条件下,不会产生危险的分解产物。 3) 在通常的储存和使用条件下,不会产生危险的分解产物。 4) 在通常的储存和使用条件下,不会产生危险的分解产物。 5) 在通常的储存和使用条件下,不会产生危险的分解产物。

第11部分 毒理学信息

毒理效应信息

急性毒性

产品/成份名称	结果	种类	剂量	暴露
1) StrataClone Vector Mix amp/kan	LD50 口服	大鼠	12600 mg/kg (毫克/千克)	-
2) 甘油				
3) StrataClone Cloning Buffer	LD50 口服	大鼠	3000 mg/kg (毫克/千克)	-
4) 氯化钠				
5) StrataClone SoloPack competent cells	LD50 口服	大鼠	12600 mg/kg (毫克/千克)	-
6) 甘油				

参考文献

1) StrataClone Vector Mix amp/kan

2) Encyclopedia of Toxicology: Reference Book, Elsevier, 2005 -, 449, 2005

3)

StrataClone Cloning Buffer

4) "Vrednie chemicheskije veshchestva. Neorganicheskie soedinenia elementov I-IV groopp" (Hazardous substances. Inorganic substances containing I-IV group elements), Filov V.A., Chimia, 1988. -, 36, 1998

5)

StrataClone SoloPack competent cells

6) Encyclopedia of Toxicology: Reference Book, Elsevier, 2005 -, 449, 2005

刺激或腐蚀

第11部分 毒理学信息

产品/成份名称	结果	种类	记分	暴露	观察
StrataClone Vector Mix amp/kan					
2) 甘油	眼睛 - 轻度刺激性	兔子	-	24 小时 500 milligrams	-
3)	皮肤 - 轻度刺激性	兔子	-	24 小时 500 milligrams	-
4)					
StrataClone Cloning Buffer					
5) 聚乙二醇	眼睛 - 轻度刺激性	兔子	-	24 小时 500 milligrams	-
6)	眼睛 - 轻度刺激性	兔子	-	500 milligrams	-
7)	皮肤 - 轻度刺激性	兔子	-	24 小时 500 milligrams	-
8)	皮肤 - 轻度刺激性	兔子	-	500 milligrams	-
9) 氯化钠	眼睛 - 中度刺激性	兔子	-	24 小时 100 milligrams	-
10)	眼睛 - 中度刺激性	兔子	-	10 milligrams	-
11)	皮肤 - 轻度刺激性	兔子	-	24 小时 500 milligrams	-
12)					
StrataClone SoloPack competent cells					
13) 甘油	眼睛 - 轻度刺激性	兔子	-	24 小时 500 milligrams	-
14)	皮肤 - 轻度刺激性	兔子	-	24 小时 500 milligrams	-

参考文献

StrataClone Vector Mix amp/kan

- 2) "Prehled Prumyslove Toxikologie; Organicke Latky," Marhold, J., Prague, Czechoslovakia, Avicenum, 1986 -,207,1986
 3) "Prehled Prumyslove Toxikologie; Organicke Latky," Marhold, J., Prague, Czechoslovakia, Avicenum, 1986 -,207,1986
 4)

StrataClone Cloning Buffer

- 5) "Sbornik Vysledku Toxilogickeho Vysetreni Latek A Pripravku," Marhold, J.V., Institut Pro Vychovu Vedoucicn Pracovniku Chemickeho Prumyclu Praha, Czechoslovakia, 1972 -,255,1972
 6) American Journal of Ophthalmology. (Ophthalmic Pub. Co., 435 N. Michigan Ave., Suite 1415, Chicago, IL 60611) Series 3: V.1- 1918- 29,1363, 1946
 7) "Sbornik Vysledku Toxilogickeho Vysetreni Latek A Pripravku," Marhold, J.V., Institut Pro Vychovu Vedoucicn Pracovniku Chemickeho Prumyclu Praha, Czechoslovakia, 1972 -,255,1972
 8) "Toxicology of Drugs and Chemicals," Deichmann, W.B., New York, Academic Press, Inc., 1969 -,747,1969
 9) "Sbornik Vysledku Toxilogickeho Vysetreni Latek A Pripravku," Marhold, J.V., Institut Pro Vychovu Vedoucicn Pracovniku Chemickeho Prumyclu Praha, Czechoslovakia, 1972 -,7,1972
 10) Toxicology and Applied Pharmacology. (Academic Press, Inc., 1 E. First St., Duluth, MN 55802) V.1- 1959- 55,501,1980
 11) "Sbornik Vysledku Toxilogickeho Vysetreni Latek A Pripravku," Marhold, J.V., Institut Pro Vychovu Vedoucicn Pracovniku Chemickeho Prumyclu Praha, Czechoslovakia, 1972 -,7,1972
 12)

StrataClone SoloPack competent cells

- 13) "Prehled Prumyslove Toxikologie; Organicke Latky," Marhold, J., Prague, Czechoslovakia, Avicenum, 1986 -,207,1986
 14) "Prehled Prumyslove Toxikologie; Organicke Latky," Marhold, J., Prague, Czechoslovakia, Avicenum, 1986 -,207,1986

敏化作用

无资料。

特异性靶器官系统毒性-一次接触

无资料。

特异性靶器官系统毒性-反复接触

无资料。

吸入危害

无资料。

慢性毒性 / 致癌性 / 致突变性 / 致畸性 / 生殖毒性

无资料。

第11部分 毒理学信息

有关可能的接触途径的信息	<input checked="" type="checkbox"/> StrataClone Vector Mix amp/kan StrataClone Cloning Buffer StrataClone Control Insert StrataClone SoloPack competent cells pUC 18 DNA Control Plasmid	进入途径被预料到：口服，皮肤，吸入。 进入途径被预料到：口服，皮肤，吸入。 无资料。 进入途径被预料到：口服，皮肤，吸入。 无资料。
---------------------	---	--

潜在的急性健康影响

吸入	<input checked="" type="checkbox"/> StrataClone Vector Mix amp/kan StrataClone Cloning Buffer StrataClone Control Insert StrataClone SoloPack competent cells pUC 18 DNA Control Plasmid	没有明显的已知作用或严重危险。 没有明显的已知作用或严重危险。 没有明显的已知作用或严重危险。 没有明显的已知作用或严重危险。 没有明显的已知作用或严重危险。
食入	<input checked="" type="checkbox"/> StrataClone Vector Mix amp/kan StrataClone Cloning Buffer StrataClone Control Insert StrataClone SoloPack competent cells pUC 18 DNA Control Plasmid	没有明显的已知作用或严重危险。 没有明显的已知作用或严重危险。 没有明显的已知作用或严重危险。 没有明显的已知作用或严重危险。 没有明显的已知作用或严重危险。
皮肤接触	<input checked="" type="checkbox"/> StrataClone Vector Mix amp/kan StrataClone Cloning Buffer StrataClone Control Insert StrataClone SoloPack competent cells pUC 18 DNA Control Plasmid	造成轻微皮肤刺激。 造成轻微皮肤刺激。 没有明显的已知作用或严重危险。 造成轻微皮肤刺激。 没有明显的已知作用或严重危险。
眼睛接触	<input checked="" type="checkbox"/> StrataClone Vector Mix amp/kan StrataClone Cloning Buffer StrataClone Control Insert StrataClone SoloPack competent cells pUC 18 DNA Control Plasmid	造成眼刺激。 造成严重眼刺激。 没有明显的已知作用或严重危险。 造成严重眼刺激。 没有明显的已知作用或严重危险。

与物理、化学和毒理特性有关的症状

吸入	<input checked="" type="checkbox"/> StrataClone Vector Mix amp/kan StrataClone Cloning Buffer StrataClone Control Insert StrataClone SoloPack competent cells pUC 18 DNA Control Plasmid	没有具体数据。 没有具体数据。 没有具体数据。 没有具体数据。 没有具体数据。 没有具体数据。
食入	<input checked="" type="checkbox"/> StrataClone Vector Mix amp/kan StrataClone Cloning Buffer StrataClone Control Insert StrataClone SoloPack competent cells pUC 18 DNA Control Plasmid	没有具体数据。 没有具体数据。 没有具体数据。 没有具体数据。 没有具体数据。 没有具体数据。
皮肤接触	<input checked="" type="checkbox"/> StrataClone Vector Mix amp/kan StrataClone Cloning Buffer StrataClone Control Insert StrataClone SoloPack competent cells	不利症状可能包括如下情况： 刺激 充血发红 不利症状可能包括如下情况： 刺激 充血发红 没有具体数据。 不利症状可能包括如下情况：

第11部分 毒理学信息

	pUC 18 DNA Control Plasmid	刺激 充血发红 没有具体数据。
眼睛接触	: StrataClone Vector Mix amp/ kan	不利症状可能包括如下情况: 疼痛或刺激 流泪 充血发红 不利症状可能包括如下情况: 疼痛或刺激 流泪 充血发红 没有具体数据。 不利症状可能包括如下情况:
	StrataClone Cloning Buffer	疼痛或刺激 流泪 充血发红 没有具体数据。 不利症状可能包括如下情况:
	StrataClone Control Insert StrataClone SoloPack competent cells	疼痛或刺激 流泪 充血发红 没有具体数据。 不利症状可能包括如下情况:
	pUC 18 DNA Control Plasmid	疼痛或刺激 流泪 充血发红 没有具体数据。
延迟和即时影响, 以及短期和长期接触引起的慢性影响		
短期暴露		
潜在的即时效应	: 无资料。	
潜在的延迟效应	: 无资料。	
长期暴露		
潜在的即时效应	: 无资料。	
潜在的延迟效应	: 无资料。	
潜在的慢性健康影响		
一般	: StrataClone Vector Mix amp/ kan StrataClone Cloning Buffer StrataClone Control Insert StrataClone SoloPack competent cells pUC 18 DNA Control Plasmid	没有明显的已知作用或严重危险。 没有明显的已知作用或严重危险。 没有明显的已知作用或严重危险。 没有明显的已知作用或严重危险。 没有明显的已知作用或严重危险。
致癌性	: StrataClone Vector Mix amp/ kan StrataClone Cloning Buffer StrataClone Control Insert StrataClone SoloPack competent cells pUC 18 DNA Control Plasmid	没有明显的已知作用或严重危险。 没有明显的已知作用或严重危险。 没有明显的已知作用或严重危险。 没有明显的已知作用或严重危险。 没有明显的已知作用或严重危险。
致突变性	: StrataClone Vector Mix amp/ kan StrataClone Cloning Buffer StrataClone Control Insert StrataClone SoloPack competent cells pUC 18 DNA Control Plasmid	没有明显的已知作用或严重危险。 没有明显的已知作用或严重危险。 没有明显的已知作用或严重危险。 没有明显的已知作用或严重危险。 没有明显的已知作用或严重危险。
致畸性	: StrataClone Vector Mix amp/ kan StrataClone Cloning Buffer StrataClone Control Insert StrataClone SoloPack competent cells pUC 18 DNA Control Plasmid	没有明显的已知作用或严重危险。 没有明显的已知作用或严重危险。 没有明显的已知作用或严重危险。 没有明显的已知作用或严重危险。 没有明显的已知作用或严重危险。

第11部分 毒理学信息

发育影响	<input checked="" type="checkbox"/> StrataClone Vector Mix amp/kan	没有明显的已知作用或严重危险。
	StrataClone Cloning Buffer	没有明显的已知作用或严重危险。
	StrataClone Control Insert	没有明显的已知作用或严重危险。
	StrataClone SoloPack competent cells	没有明显的已知作用或严重危险。
	pUC 18 DNA Control Plasmid	没有明显的已知作用或严重危险。
生育能力影响	<input checked="" type="checkbox"/> StrataClone Vector Mix amp/kan	没有明显的已知作用或严重危险。
	StrataClone Cloning Buffer	没有明显的已知作用或严重危险。
	StrataClone Control Insert	没有明显的已知作用或严重危险。
	StrataClone SoloPack competent cells	没有明显的已知作用或严重危险。
	pUC 18 DNA Control Plasmid	没有明显的已知作用或严重危险。

毒性的度量值

急性毒性估计值

接触途径	急性毒性当量(ATE value)
<input checked="" type="checkbox"/> StrataClone Cloning Buffer 口服	122950.8 mg/kg (毫克/千克)

第12部分 生态学信息

毒性

产品/成份名称	结果	种类	暴露
<input checked="" type="checkbox"/> StrataClone Vector Mix amp/kan			
2) 甘油	剧烈 LC50 54000 mg/l (毫克/升) 淡水	鱼 - <i>Oncorhynchus mykiss</i>	96 小时
3) StrataClone Cloning Buffer			
4) 聚乙二醇	剧烈 LC50 >1000000 µg/l 淡水	鱼 - <i>Salmo salar</i> - 幼鱼	96 小时
5) 氯化钠	剧烈 EC50 2430000 µg/l 淡水	藻类 - <i>Navicula seminulum</i>	96 小时
6)	剧烈 EC50 28.85 mg/dm ³ 淡水	藻类 - <i>Pseudokirchneriella subcapitata</i>	72 小时
7)	剧烈 EC50 519.6 mg/l (毫克/升) 淡水	甲壳类动物 - <i>Cypris subglobosa</i>	48 小时
8)	剧烈 IC50 6.87 g/L 淡水	水生植物 - <i>Lemna minor</i>	96 小时
9)	剧烈 LC50 1661 mg/l (毫克/升) 淡水	水蚤 - <i>Daphnia magna</i>	48 小时
10)	剧烈 LC50 1000000 µg/l 淡水	鱼 - <i>Morone saxatilis</i> - 幼虫	96 小时
11)	慢性 LC10 781 mg/l (毫克/升) 淡水	甲壳类动物 - <i>Hyalella azteca</i> - 幼雏 (雏鸟, 新孵化的, 刚断奶的)	3 周
12)	慢性 NOEC 6 g/L 淡水	水生植物 - <i>Lemna minor</i>	96 小时
13)	慢性 NOEC 0.314 g/L 淡水	水蚤 - <i>Daphnia pulex</i>	21 天
14)	慢性 NOEC 100 mg/l (毫克/升) 淡水	鱼 - <i>Gambusia holbrooki</i> - 成体	8 周
15) StrataClone SoloPack competent cells			
16) 甘油	剧烈 LC50 54000 mg/l (毫克/升) 淡水	鱼 - <i>Oncorhynchus mykiss</i>	96 小时
17) 二水合氯化钙	剧烈 EC50 2900 mg/l (毫克/升) 淡水	藻类	72 小时
18)	剧烈 NOEC 2000 mg/l (毫克/升) 淡水	水蚤	48 小时

参考文献

第12部分 生态学信息

StrataClone Vector Mix amp/kan

2) ECHA, United States Department of the Interior, Fish and Wildlife Service, Resource Publication 137

3)

StrataClone Cloning Buffer

4) Water Res. 8(7): 433-437

5) Final Rep.No. RG-3965(C2R1), U.S.Public Health Service Grant, Acad.of Nat. Sci., Philadelphia, PA:89 p.

6) Pol. Arch. Hydrobiol.46(3/4): 345-352

7) J. Hazard. Mater.172(2/3): 641-649

8) Biotemas22(3): 27-33

9) Water Res.21(12): 1453-1462

10) Proc. Annu. Conf. Western Assoc. State Game Fish Comm.:15 p.

11) Sci. Total Environ.414:238-247

12) Biotemas22(3): 27-33

13) University of Kentucky, Lexington, KY:73 p.

14) Ecotoxicol. Environ. Saf.63(3): 343-352

15)

StrataClone SoloPack competent cells

16) ECHA, United States Department of the Interior, Fish and Wildlife Service, Resource Publication 137

17) ECHA

18) ECHA

持久性和降解性

无资料。

潜在的生物累积性

产品/成份名称	LogP _{ow}	生物富集系数	潜在的
StrataClone Vector Mix amp/kan 甘油	-1.76	-	低
StrataClone Cloning Buffer 聚乙二醇	-	3.2	低
StrataClone SoloPack competent cells 甘油	-1.76	-	低

土壤中的迁移性

土壤/水分配系数 (K_{oc}) : 无资料。

其他环境有害作用

: 没有明显的已知作用或严重危险。

第13部分 废弃处置

处置方法

: 应尽可能避免或减少废物的产生。 产品、溶液和其副产品的处置应符合环境保护、废弃物处理法规和当地相关法规的要求。
经由特许的废弃物处理合同商处理剩余物与非再生产品。
废物不应未经处置就排入下水道，除非完全符合所有管辖权内主管机构的要求。
包装废弃物应回收。 仅在回收利用不可行时，才考虑焚烧或填埋。
采用安全的方法处理本品及其容器。 操作处置没有清洁或冲洗的空容器时，应小心处理。 空的容器或内衬可能保留一些产品的残余物。
避免溢出物扩散和流走，避免溢出物接触进入土壤、河流、下水道和污水管道。

第14部分 运输信息

法规信息

UN / IMDG 类别 : 不受管制。

	联合国危险货物编号 (UN号)	正确的运输名称	类别	标签	环境危害	PG*	其他信息
中国	不受管制。				无。		
IATA 分类	Not regulated.	-	-		No.	-	-

第14部分 运输信息

运输注意事项 : 在用户场地内运输时：运输时始终采用密封的容器并保持直立固定。应确定运输人员明白在发生事故或发生泄漏时应采取的措施。

灭火介质

适用灭火剂 :

StrataClone Vector Mix amp/kan	使用适合扑灭周围火灾的灭火剂。
StrataClone Cloning Buffer	使用适合扑灭周围火灾的灭火剂。
StrataClone Control Insert	使用适合扑灭周围火灾的灭火剂。
StrataClone SoloPack competent cells	使用适合扑灭周围火灾的灭火剂。
pUC 18 DNA Control Plasmid	使用适合扑灭周围火灾的灭火剂。

不适用灭火剂 :

StrataClone Vector Mix amp/kan	没有已知信息。
StrataClone Cloning Buffer	没有已知信息。
StrataClone Control Insert	没有已知信息。
StrataClone SoloPack competent cells	没有已知信息。
pUC 18 DNA Control Plasmid	没有已知信息。

禁配物 :

StrataClone Vector Mix amp/kan	会与氧化剂起反应或与氧化剂不相容。
StrataClone Cloning Buffer	会与氧化剂起反应或与氧化剂不相容。
StrataClone Control Insert	会与氧化剂起反应或与氧化剂不相容。
StrataClone SoloPack competent cells	会与氧化剂起反应或与氧化剂不相容。
pUC 18 DNA Control Plasmid	会与氧化剂起反应或与氧化剂不相容。

第15部分 法规信息

中国现有化学物质名录 (IECSC) : 所有组分都列出或被豁免。

禁止进口物质清单

所有组分均未列入该目录。

危险化学品目录

组分名称	CAS号码	状态	参考号码
StrataClone SoloPack competent cells 氢氧化钾	1310-58-3	列出的	1667

禁止出口物质清单

所有组分均未列入该目录。

中国严格限制进出口的有毒化学品清单

所有组分均未列入该目录。

国际法规

化学武器公约第一、二、三类清单化学品

未列表。

蒙特利尔公约 (附件A、B、C、E)

未列表。

关于持久性有机污染物的斯德哥尔摩公约

未列表。

第15部分 法规信息

鹿特丹“事先知情同意”(PIC) 公约

未列表。

关于持久性有机污染物及重金属的 UNECE 奥胡斯协议

未列表。

国际列表

国家清单

澳大利亚	: 所有组分都列出或被豁免。
加拿大	: 所有组分都列出或被豁免。
欧洲	: <input checked="" type="checkbox"/> 所有组分都列出或被豁免。
日本	: <input checked="" type="checkbox"/> 本目录 (ENCS (现有和新化学品)) : 未确定。 日本目录 (ISHL): 未确定。
马来西亚	: <input checked="" type="checkbox"/> 确定。
新西兰	: <input checked="" type="checkbox"/> 所有组分都列出或被豁免。
菲律宾	: <input checked="" type="checkbox"/> 确定。
韩国	: <input checked="" type="checkbox"/> 确定。
台湾	: <input checked="" type="checkbox"/> 所有组分都列出或被豁免。
火鸡	: <input checked="" type="checkbox"/> 确定。
美国	: <input checked="" type="checkbox"/> 所有组分都列出或被豁免。

第16部分 其他信息

发行记录

发行日期/修订日期	: 29/07/2016
上次发行日期	: 31/07/2013.
版本	: 2

用于得出分类的程序

分类	理由
StrataClone Vector Mix amp/kan 皮肤腐蚀/刺激 - 类别 3 严重眼损伤/眼刺激 - 类别 2B	计算方法 计算方法
StrataClone Cloning Buffer 皮肤腐蚀/刺激 - 类别 3 严重眼损伤/眼刺激 - 类别 2A	计算方法 计算方法
StrataClone SoloPack competent cells 皮肤腐蚀/刺激 - 类别 3 严重眼损伤/眼刺激 - 类别 2A	计算方法 计算方法

参考文献 : 无资料。

指出自上次发行的版本以来发生过更改的信息。

读者注意事项

声明 本文件所包含的信息是基于安捷伦准备文件时所掌握的知识。安捷伦不就其为特定目的之精确性、完整性或适用性做出明示或暗示的保证。